

ID: 1118398

# SUPORTE NUTRICIONAL ESPECIALIZADO NA CICATRIZAÇÃO PÓS-OPERATÓRIA DE PACIENTE COM CÂNCER DE OVÁRIO: RELATO DE CASO

Amanda Rafaela Gonçalves Rangel<sup>1</sup>; Amanda Danielli Soares de Oliveira <sup>1</sup>; Ana Cláudia Zanini <sup>2</sup>; Gabriela Faria de Oliveira <sup>2</sup>; Gleide Mara Gadelha da Silva <sup>1</sup>; Maria Eduarda de Oliveira Camargo <sup>1</sup>

<sup>1</sup>Instituto de Oncologia do Paraná, Curitiba – PR; <sup>2</sup>Prodiет Medical Nutrition, Cidade – PR.

E-mail para contato: [amanda.rafaela.rgr@email.com](mailto:amanda.rafaela.rgr@email.com); [cientifico@prodiet.com.br](mailto:cientifico@prodiet.com.br)

## APRESENTAÇÃO DO CASO:

- Sexo feminino, 46 anos.
- Câncer de ovário IV e carcinomatose peritoneal.
- Em 17/05/2025: submetida à cirurgia de citorredução.
- Evoluiu com deiscência de sutura em região abdominal.
- Em 03/06/2025: lesão com 17,5 m x 1,2cm (figura 1), presença de necrose, esfacelo e exsudato seropurulento.
- **Intervenção nutricional:** oferta do SNO específico para cicatrização (CORRECTMax – Prodiет Medical Nutrition), 2 sachês/ dia.
- No primeiro mês, devido à baixa ingestão alimentar, foi associado um suplemento calórico-proteico (ENERGYZIP – Prodiет Medical Nutrition).
- **Intervenção de enfermagem:** troca do curativo três vezes na semana, com limpeza da ferida com SF 0,9%, e aplicação de solução de PHMB e curativo com Aquacel Ag+.
- **Mês 1 de acompanhamento:** aumento da largura (4,5cm) devido ao rompimento de 1 ponto, mantendo o comprimento inicial. Apresentava 80% de granulação, 20% de esfacelo e exsudato em média quantidade (figura 2).
- **Mês 2 de acompanhamento:** redução para 9cm x 2,5cm, predominância de tecido de granulação e início de epitelização (figura 3). Perda ponderal de 3,2% de peso corporal.

## DISCUSSÃO:

A boa adesão ao suplemento nutricional especializada foi determinante para a evolução clínica positiva.

## COMENTÁRIOS FINAIS:

A atuação multiprofissional integrada foi fundamental para o sucesso do caso, permitindo uma abordagem personalizada, adesão satisfatória e desfecho clínico favorável.



Figura 1: prévio a intervenção



Figura 2: após 1 mês de intervenção



Figura 3: após 2 meses de intervenção

## REFERÊNCIAS:

Sociedade Brasileira de Nutrição Parenteral e Enteral (BRASPEN). Campanha Diga Não à Lesão por Pressão. BRASPEN J 2020; 35 (Supl. 1)  
SOCIEDADE BRASILEIRA DE NUTRIÇÃO ONCOLÓGICA. I Consenso brasileiro de nutrição oncológica da SBNO. 1. ed. Rio de Janeiro: SBNO, 2021. 164 p. ISBN 978-65-86850-04-8.

REALIZAÇÃO: